


Statistik

Vorlesung 5 (Tests I)

K.Gerald van den Boogaart

<http://www.math-inf.uni-greifswald.de/statistik>



Vereinfachtes Beispiel

Die Situation

Eine Firma leitet mit Rimit verunreinigte Abwässer in ein Fluß ein. Gemäß der gesetzlichen Bestimmungen dürfen höchstens $7,5\text{ppm}$ Rimit in den eingeleiteten Wässern sein.

Die Beobachtung

Ihre Umweltschutzorganisation entnimmt eine Probe. Das Labor bestimmt den Rimit Gehalt mit 9.25ppm mit einem standardisierten Verfahren mit einer Standardabweichung von 1ppm und einem normalverteilten Messfehler.


Das Probleme

Um das Unternehmen anzuzeigen, benötigt Ihre Umweltschutzorganisation einen wissenschaftlichen Nachweis, dass tatsächlich zu viel Rimit eingeleitet wurde.

Probemessungen im Labor

Das Labor hat 1000 Proben mit genau 7,5ppm Rimit gemessen:

Histogram of rnorm(1000, 7.5, 1)



Messungen streuen

Es kann also auch wenn die Firma sich korrekt verhalten hat, durch Zufall ein Wert über $9ppm$ gemessen werden.

Hypothese

Es gibt zwei Möglichkeiten:

Hypothese H_0 : Die Firma leitet korrekt ein (d.h. $7,5\text{ppm}$)
vs. (gegen)

Alternative H_1 : Die Firma überschreitet den Grenzwert.

Test

Wir benötigen ein wissenschaftliches Verfahren (genannt Test), welches in der Lage ist zu beweisen, dass die Firma zu viel einleitet.

$$T(\text{Daten}) = \begin{cases} 0 & \text{Hypothese möglich} \\ 1 & \text{Hypothese widerlegt} \end{cases}$$

Die Fehlerarten

	Einleitung korrekt	zu viel Rimit
$T(X) = 0$	keine Aktion richtige Entscheidung	fortgesetzte Umweltverschmutzung falsche Entscheidung Fehler 2.Art/ β -Fehler
$T(X) = 1$	Unschuldige beschuldigt falsche Entscheidung Fehler 1.Art/ α -Fehler	Berechtigte Klage richtige Entscheidung

Nachweis auf einem α -Niveau

Vorgehensweise:

Man bestimmt eine Entscheidungsregel so, dass die Wahrscheinlichkeit für einen Fehler 1. Art, wenn die Hypothese stimmt unter α liegt.

z.B. in den Naturwissenschaften normalerweise

$$\alpha = 0.05 = 5\%$$

Leistungsfähige Tests

Ein guter Test sollte, wenn die Alternative stimmt, so wahrscheinlich wie möglich tatsächlich die Hypothese ablehnen.

Die Wahrscheinlichkeit für einen Fehler 2.Art sollt also so gering wie möglich sein.

Konstruktion eines Tests

Je größer der Messwert, desto eher wurde der Grenzwert überschritten:

$$T(X) = \begin{cases} 0, & \text{falls } X < k \\ 1, & \text{falls } X \geq k \end{cases}$$

k heißt kritischer Wert.

Wähle k so, dass (wenn die Hypothese stimmt)


$$P(X > k) = \alpha = 0.05$$

Falls X normalverteilt mit Mittelwert 7,5 und Standardabweichung 1 so ist

$$k = 9.14485362695147$$

Kritischer Wert

Histogram of `rnorm(1000, 7.5, 1)`



Die Umweltschutzorganisation

Es wurde $9,25\text{ppm}$ gemessen:

$$T(9,25\text{ppm}) = \begin{cases} 0, & \text{falls } 9,25\text{ppm} < 9.14485362695147 \\ 1, & \text{falls } 9,25\text{ppm} \geq 9.14485362695147 \end{cases} = 1$$

Also ist auf dem 5%-Niveau der Nachweis erbracht, dass die Firma zu viel Rimit einleitet.

Ein Test hat

- Namen (hier: einfacher einseitiger Gauss-Test)

Ein Test hat

- Namen
- Anwendungssituation
Überprüfen ob der wahre Erwartungswert einen festen Wert (hier 7,5) übersteigt, wenn eine normalverteilte Messung mit bekannter Varianz σ^2 vorliegt.

Ein Test hat

- Namen
- Anwendungssituation
- Hypothese und Alternative
 $H_0 : \mu = 7,5$ vs. $H_1 : \mu > 7,5$


Ein Test hat

- Namen
- Anwendungssituation
- Hypothese und Alternative
- Voraussetzungen

$$X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

Ein Test hat

- Namen
- Anwendungssituation
- Hypothese und Alternative
- Voraussetzungen
- Ein Entscheidungsverfahren
Meist im Computer implementiert.



Multiple Testen

Werden mehrer Tests durchgeführt, so entsteht eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür, dass auch richtige Hypothesen abgelehnt werden.

Erläuterung an der Tafel

Bonferroni

Lösungsmöglichkeit von Bonferroni:

Will man insgesamt ein α -Niveau einhalten, so wählt man bei der Durchführung von n Tests für jeden einzelnen Test ein α -Niveau von $\tilde{\alpha} := \frac{\alpha}{n}$

Erläuterung an der Tafel

p-Werte

Werden statistische Tests am Computer durchgeführt, so wird statt einer Entscheidung ein p-Wert ausgegeben: Der p-Wert ist das kleinste α -Niveau zu dem der Test gerade noch ableht:
Wichtig!!!!, Wichtig!!!!, Wichtig!!!!

Test lehnt die Hypothese ab, genau dann wenn $p \leq \alpha$

Wichtig!!!!, Wichtig!!!!, Wichtig!!!!